RECIDIVA LOCAL DEL CANCER DE MAMA TRAS RECONTRUCCION CON INJERTO AUTÓLOGO

A.Sala Hernández; R.Jiménez Rosellón; Ruíz A; Argüelles B; P.Ripoll Orts
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

La mastectomía seguida de reconstrucción con colgajo autólogo es un procedimiento oncológicamente seguro. Tras ello, la recidiva local es infrecuente (<1%).

PACIENTES Y MÉTODOS

Entre los años 2006 y 2016 se han realizado, en nuestro centro hospitalario, 318 mastectomías por cáncer de mama con reconstrucción con colgajo autólogo posterior. De estos pacientes, 3 casos (0,94%) presentaron recidiva local. Las características histológicas, exploraciones complementarias, tratamiento y evolución posterior se muestran en la tabla 1.

RESULTADOS

CASOS	1	2	3
EDAD	40	38	45
MENOPAUSICA	NO	NO	SI
Hº FAMILIAR CANCER MAMA	NO	SI	NO
Hº PERSONAL DE CANCER MAMA	NO	BRCA +	NO
EDAD AL DX	33	34	40
INMUNO-HISTOQUÍMICA	CA. DUCTAL INFILTRANTE GIII RRHH- KI67 80% HER2+	CA. DUCTAL INFILTRANTE GII RRHH + KI67 60% HER2-	CA.DUCTAL INFILTRANTE GI RRHH- KI67 20% HER2+
ESTADIAGE	T2N0M0	T1N1M0	T4N1M0
TRATAMIENTO NEOADYUVANTE	SI	NO	SI
CIRUGÍA	MASTECTOMIA SIMPLE	MASTECTOMIA SIMPLE	MASTECTOMÍA SIMPLE
RECONSTRUCCIÓN	INMEDIATA	DIFERIDA	INMEDIATA
TIPO COLGAJO	LATISIMO	TRAM LIBRE	LATISIMO
COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS	NO	NO	NO
TRATAMIENTO ADYUVANTE	RADIOTERAPIA	RADIOTERAPI Y QUIMIOTERAPIA Y HORMONOTERAPIA	QUIMIOTERAPIA
TIEMPO RECURRENCIA LOCAL	4 MESES	18 MESES (cutánides Fig 1 y 2)	29 MESES
TRATAMIENTO RECURRENCIA	EXÉRESIS	EXÉRESIS	QUIMIOTERAPIA
METÁSTASIS	NO	NO	NO
EXITUS	NO	NO	NO




Figura.1 PET-TC
Nódulos subcentimétricos en cuadrante supero-interno de la mama izquierda

Figura.2 PET-TC

COMENTARIO

Los factores asociados a la recurrencia local no están bien definidos en la literatura.
La mayoría de los casos publicados se asocian con tumores de gran tamaño, ganglios afectos y un grado de diferenciación tumoral bajo.
En nuestra pequeña serie destacan tumores con alto índice de proliferación, dos casos localmente avanzados y Her 2 positivos.

Bibliografía

1. *Medina-Franco H, et al. Factors associated with local recurrence after skin-sparing mastectomy and immediate breast reconstruction for invasive breast cancer. Ann Surg 2002;235(6):814-9.*
2. *Simmons RM et al. Local and distant recurrence rates in skin-sparing mastectomies compared with non-skin-sparing mastectomies. Ann Surg Oncol 1999;6(7):676-81.*