


CÁNCER DE MAMA EN EL VARÓN: NUESTRA EXPERIENCIA

De la Herranz P, Fernández P, Albalat R, del Río F, Novo J, Cordón A, La Calle M.

Unidad Cirugía de Mama. HUV Macarena. Sevilla

OBJETIVO:

Analizar nuestra serie de pacientes varones que han presentado carcinoma de mama

MATERIAL Y MÉTODO:

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes varones en edad adulta que han presentado carcinoma de mama durante el periodo 2012 a 2016.

6 PACIENTES

5 MASTECTOMÍAS
1 TUMORECTOMÍA

2 LINFADENECTOMÍAS

5 LUMINAL A
1 LUMINAL B

RESULTADOS:

Se han registrado 6 casos con una edad media de 57 años. El 16.6% presentó carcinoma de mama izquierdo y el 83.4% derecho.

La mastectomía fue la técnica realizada en 5 pacientes y la tumorectomía en un único paciente, intervenido en un centro privado y remitido a nuestro hospital para completar tratamiento.

A cinco pacientes se les realizó BSGC, precisando tan sólo un paciente completar la linfadenectomía por presentar dos ganglios centinelas con macrometástasis. A un paciente se le realizó linfadenectomía por detectarse una adenopatía radiológicamente sospechosa, cuyo resultado histológico tras PAAF confirmó la presencia de células malignas.

El subtipo histopatológico fue en todos ellos ductal infiltrante. El tamaño medio del tumor fue de 1.8 cm. Cinco pacientes presentaron inmunohistoquímica compatible con Luminal A, y uno con Luminal B, cuyo Ki 67 fue del 40%. Los seis pacientes fueron negativos para HER 2.

Todos los pacientes recibieron tratamiento adyuvante con quimioterapia y hormonoterapia, mientras que tres de ellos además recibieron radioterapia.

Actualmente todos los pacientes continúan en seguimiento por el servicio de Oncología. Ninguno de ellos ha presentado recidiva ni presencia de metástasis a distancia.

CONCLUSIONES:

El cáncer de mama es una enfermedad poco frecuente en el varón. Supone aproximadamente entre el 0,6 y el 1% del total de cáncer de mama en ambos sexos. A diferencia con el cáncer de mama en la mujer, su incidencia va aumentando con la edad. No existen grandes diferencias en el algoritmo diagnóstico-terapéutico con respecto a la mujer. Si bien, la técnica quirúrgica más frecuentemente realizada es la mastectomía, dejando relegada la cirugía conservadora a casos seleccionados.