


# RECONSTRUCCIÓN POSTMASTECTOMIA EN UN SÓLO TIEMPO; PRÓTESIS + MALLA TITANIZADA. NUESTRA EXPERIENCIA

unidad funcional de mama

## AUTORES

Isabel Grifo, Carlos Fuster, Ramón Gómez, Sara Jareño, Ernesto Sanz, Guillermo Valderas
Unidad Funcional de mama. Servicio de Cirugía General, Servicio de Cirugía plástica y reconstructiva
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VALENCIA.

## OBJETIVO


Presentar nuestros resultados inciales tras un año de utilización de mallas titanizadas para la reconstrucción en un sólo tiempo tras la mastectomia.

## RESULTADOS


| | |
|---|---|
| **EDAD** | 46'3a |
| **IMC** | 23'5 |
| **AP NEO MAMA** | 50% (7/14) |
| **AP CIRUGÍA MAMA** | 57% |
| **FUMADORA** | 7% (1/14) |
| **OTROS AP** | 0% |
| **RT** | 21% (3/14) |
| **QT NEOADYUVANTE** | 7'1% (1/14) |

| | |
|---|---|
| **MASTECTOMIA PROFILÁCTICA** | 57'1% (8/14) |
| **MASTETCOMIA TERAPÉUTICA** | 42'8% (6/14) |
| **LINFADENECTOMIA** | 7'1% (1/14) |
| **EXPANSOR** | 7'1% (1/14) |
| **VOLUMEN PRÓTESIS** | 444cc (350-620) |
| **DRENAJES** | 100% |

| | |
|---|---|
| **SEROMA** | 0% |
| **HEMATOMA** | 14% (2/14) |
| **INFECCIÓN** | 0% |
| **NECROSIS CUTÁNEA** | 14% (2/14) |
| **DEHISCENCIA** | 7% (1/14) |
| **EXPOSICIÓN MALLA** | 7% (1/14) |
| **EXTRUSIÓN PRÓTESIS** | 0% |
| **RETIRADA PRÓTEIS** | 0% |
| **REINTERVENCIÓN** | 7% (1/14) |



**PREOPERATORIO**



**1º MES INTERVENCIÓN**



**RESULTADO FINAL**

## CONCLUSIONES

Con la reconstrucción mamaria en un sólo tiempo con prótesis y malla de polipropileno titanizada se ahorra una intervención quirúrgica y nuestros resultados iniciales muestran una adecuada integración tisular y buenos resultados estéticos, sin requerir las pacientes criterios estrictos para su utilización.




# RECONSTRUCCIÓN POSTMASTECTOMIA EN UN SÓLO TIEMPO; PRÓTESIS + MALLA TITANIZADA. NUESTRA EXPERIENCIA


## AUTORES

Isabel Grifo, Carlos Fuster, Ramón Gómez, Sara Jareño, Ernesto Sanz, Guillermo Valderas
Unidad Funcional de mama. Servicio de Cirugía General, Servicio de Cirugía plástica y reconstructiva
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VALENCIA.


## OBJETIVO

Presentar nuestros resultados inciales tras un año de utilización de mallas titanizadas para la reconstrucción en un sólo tiempo tras la mastectomia.

## RESULTADOS

| | |
|---|---|
| EDAD | 46'3a |
| IMC | 23'5 |
| AP NEO MAMA | 50% (7/14) |
| AP CIRUGIA MAMA | 57% |
| FUMADORA | 7% (1/14) |
| OTROS AP | 0% |
| RT | 21% (3/14) |
| QT NEOADYUVANTE | 7'1% (1/14) |

| | |
|---|---|
| MASTECTOMIA PROFILACTICA | 57'1% (8/14) |
| MASTECTOMIA TERAPEUTICA | 42'8% (6/14) |
| LINFADENECTOMIA | 7'1% (1/14) |
| EXPANSOR | 7'1% (1/14) |
| VOLUMEN PROTESIS | 444cc (350-620) |
| DRENAJES | 100% |


| | |
|---|---|
| SEROMA | 0% |
| HEMATOMA | 14% (2/14) |
| INFECCION | 0% |
| NECROSIS CUTÁNEA | 14% (2/14) |
| DEHISCENCIA | 7% (1/14) |
| EXPOSICION MALLA | 7% (1/14) |
| EXTRUSION PROTESIS | 0% |
| RETIRADA PROTEIS | 0% |
| REINTERVENCION | 7% (1/14) |



PREOPERATORIO



1º MES INTERVENCIÓN



RESULTADO FINAL

## CONCLUSIONES

Con la reconstrucción mamaria en un sólo tiempo con prótesis y malla de polipropileno titanizada se ahorra una intervención quirúrgica y nuestros resultados iniciales muestran una adecuada integración tisular y buenos resultados estéticos, sin requerir las pacientes criterios estrictos para su utilización.