35º CONGRESO SESPM 6-8 OCTUBRE 2016
11ª Reunión SETS · Reunión Iberoamericana de la FLAM

REPERCUSIÓN EN EL MANEJO QUIRÚRGICO DE LA ECOGRAFÍA DE REEVALUACIÓN PARA CARACTERIZACIÓN DE LESIONES DETECTADAS EN RESONANCIA

Estellés Vidagany N., Martínez García R., Sebastián Tomás J.C., Martínez López E., Payá Llorente C., Durán Bermejo M.I., Sospedra Ferrer R.

Unidad de Patología Mamaria Endocino. Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospital Universitario Doctor Peset

OBJETIVO:

Evaluar la utilidad de la ecografía de reevaluación para la identificación y caracterización de lesiones detectadas incidentalmente en la resonancia magnética (RM) durante el estudio de una neoplasia de mama y su posterior repercusión en el manejo médico-quirúrgico.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Cohorte retrospectiva de 110 pacientes con neoplasia de mama a las que se les realizó ecografía de reevaluación tras la RM de estadificación en el período de Enero del 2013 a Diciembre de 2015.


RESULTADOS:

La resonancia magnética identificó 168 lesiones nuevas, de las cuales 123 (73,2%) se identificaron en la ecografía de reevaluación, se biopsiaron 52 (42,3%) siendo 17 (32,7%) malignas.

De todas las lesiones que se biopsiaron por ecografía, el 38,5% supusieron un cambio en la actitud quirúrgica, de modo que en el 60% de los casos se realizó la exéresis de una nueva lesión, en el 35% condicionaron un cambio de cirugía conservadora a mastectomía y en el 5% (un caso) el cambio fue de mastectomía a mastectomía bilateral.

LESIONES IDENTIFICADAS EN ECOGRAFÍA REEVALUACIÓN = 123 (73,2%)

BI-RADS 2	BI-RADS 3	BI-RADS 4
11	88	24
No seguimiento	Seguimiento = 52 BAG = 36 (7 malignas)	BAG = 14 (8 malignas) BAV = 2 (2 malignas)




Nódulo redondeado de bordes espiculados en MD en paciente con neoplasia de MI.




Nódulo sólido, redondeado y bordes microangulados sugestivo de neoplasia.

LESIONES NO IDENTIFICADAS EN ECOGRAFÍA REEVALUACIÓN = 45 (26,8%)

BI-RADS 3	BI-RADS 4
41	4
Seguimiento = 40 BAV RM = 1 (benigna)	BAV = 3 (1 maligna)



Nódulo redondeado probablemente benigno.



Nódulo sólido, redondeado de bordes lisos por probable fibroadenoma.

CONCLUSIONES:

La ecografía de reevaluación es útil para identificar y caracterizar lesiones adicionales halladas en la RM de estadificación, permitiendo realizar biopsia en un alto número de casos , lo cual puede condicionar un cambio en la actitud quirúrgica prevista, optimizando de esta manera la cirugía para cada paciente.