El cambio en la indicación de la neoadyuvancia en el cáncer de mama ¿Ha producido un cambio en la indicación quirúrgica?

Vaqué, C. Buch, E. Alarcón, M. Fernandez, I. Ibañez, A. Gara, A. Díaz, S. Alos, R. Hospital de Sagunto

Objetivos

Nuestro objetivo es determinar si el cambio de indicación de Qi ha modificado nuestras indicaciones quirúrgicas

Material y Métodos

Hemos recogido de forma retrospectiva desde 2013 al 15 las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama.


Resultados

2013 — **2014** — **2015**

Indicación de neoadyuvancia:
- Más centrada en TNM
- **Grupo A**

Cambio en la indicación de neoadyuvancia

Indicación de neoadyuvancia:
- Más centrada en biología molecular
- **Grupo B**



Conclusión

Las nuevas clasificaciones e indicaciones de la Quimioterapia de inducción en el cáncer de mama ha disminuido en nuestro hospital la utilización de ésta, aumentando en consecuencia el número de cirugías radicales sobre la mama.
Sin embargo, esta situación ha provocado la inclusión de un mayor número de reconstrucciones inmediatas en nuestras pacientes.

Bibliografía

1: Yang Y, Im SA, Keam B,et ak. Prognostic impact of AJCC response criteria for neoadjuvant chemotherapy in stage II/III breast cancer patients: breast cáncer subtype analyses. BMC Cancer. 2016 Jul 21;16:515.
2: El Benna H, Zribi A, Laabidi S, Het al. Ki-67: role in diagnosis, prognosis and follow-up after treatment of breast cancers. Tunis Med. 2015 Dec;93(12):737-41