ESTUDIO COMPARATIVO DE 36 HOMBRES CON CÁNCER DE MAMA CON GRUPO CONTROL DE MUJERES

CARIDAD MARIN HERNANDEZ, PJ. GIL, P. GALINDO, A. PIÑERO, JL. ALONSO, P. PARRILLA

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA. MURCIA

▪**OBJETIVO:** El cáncer de mama (CM) es una entidad poco frecuente en el varón (<1%). Actualmente el diagnóstico y el tratamiento es similar en ambos sexos aunque la supervivencia comunicada es menor en el hombre posiblemente por el retraso en el diagnóstico. El Objetivo de esta comunicación es comparar un grupo de 34 varones con un grupo control de mujeres (1:4) con CM intervenidos en un hospital de tercer nivel.

▪**MATERIAL Y MÉTODOS:** Presentamos una serie de 34 varones intervenidos de CM comparándolo con un grupo control de mujeres con CM (1:4) intervenidos desde enero de 2002 a diciembre de 2015.. Se han estudiado variables pre, peri y postoperatorias realizando un análisis descriptivo y comparativo de las mismas, incluido las variables de supervivencia e intervalo libre de enfermedad (ILE)

▪**RESULTADOS:** En el estudio comparativo los varones presentaron una edad media superior que las mujeres de forma significativa (69,21 7 vs 53,41 12,28; p<0,001). No existe diferencia significativa en cuanto a los antecedentes familiares (p=0,444) y la clínica de presentación (p=0,101), si bien, los tumores solían ser palpables en varones en mayor proporción que en mujeres (92,9 vs 69,6%; p=0,075). No hemos encontrado diferencias en cuanto a los hallazgos mamográficos se refiere (p=0,398). El tamaño tumoral fue similar en ambos grupos (21 vs 22,89 mm; p=0,740). A todos los varones se les realizó una mastectomía radical, frente al 30,4% de las mujeres (p<0,001) y no hubo diferencias en la tasa de positividad de ganglios centinela (p=0,167) ni en la distancia del tumor al margen quirúrgico (p=0,303). En el análisis histológico los tumores del grupo de los varones predominaron los de bajo grado (50%), y en el grupo de las mujeres los de alto grado (57,6%) (p=0,028). Aunque los perfiles inmunohistoquímicos no fueron diferentes entre uno y otro grupo (p=0,99), sí que parece existir una mayor expresión de receptores hormonales en el grupo de varones (estrógenos p=0,054; progestágenos p=0,015). En cuanto al tratamiento adyuvante, las mujeres recibieron radioterapia en más casos que los varones (p<0,001), posiblemente debido a la técnica quirúrgica empleada (cirugía conservadora). Al comparar ambos grupos no existieron diferencias entre varones y mujeres en cuanto a ILE (p=0,21) y supervivencia (p=0,48).

CONCLUSIONES: Los varones con CM presentan una edad media superior en el momento del diagnóstico así como una mayor expresión de receptores. No hemos encontrado diferencias en la supervivencia o intervalo libre de enfermedad en ambos grupos .




Imagen del nódulo . La BAG confirmó un carcinoma ductal infiltrante



Resultado tras la mastectomía